

## Инструкция дапоксетин

Препарат предназначен мужчинам для лечения расстройства преждевременного семяизвержения (преждевременная эякуляция).

Антидепрессивное средство, селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Улучшает настроение, снижает напряженность, тревожность, стресс, и чувство страха. Увеличивает среднюю продолжительность полового акта.

Не вызывает ортостатической гипотензии, седативного эффекта, некардиотоксичен. Стойкий эффект наступает через 1-2 часа после приёма. Совместим с препаратами для повышения потенции: виагра, сиалис и левитра.

Прилиджи принимают внутрь за 1-3 часа до ожидаемого полового акта по 1 таблетке (60 мг). Наибольшая активность препарата наблюдается уже через 1,5-2 часа после приема.

Противопоказания: Гиперчувствительность, ХПН (КК менее 10 мл/мин), выраженная печеночная недостаточность, суицидальная настроенность, одновременный прием ингибиторов MAO (в предшествующие 2 нед), С осторожностью. Сахарный диабет, эпилептический синдром различного генеза и эпилепсия (в т.ч. в анамнезе), болезнь Паркинсона, компенсированные почечная и/или печеночная недостаточность, кахексия.

Возможные побочные действия (при регулярном длительном применении): Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, сонливость или бессонница, вялость, повышенная утомляемость, астения, тремор, ажитация, тревожность, суицидальная наклонность (свойственная больным с депрессивными расстройствами), мания или гипомания. Со стороны пищеварительной системы: снижение аппетита, сухость во рту или гиперсаливация, тошнота, диарея. Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница. Прочие: повышенное потоотделение, похудание, снижение

либидо, системные нарушения со стороны легких, почек или печени, васкулиты. Передозировка. Симптомы: тошнота, рвота, состояние возбуждения, судороги. Лечение: промывание желудка, назначение активированного угля, при судорогах - анксиолитических ЛС (транквилизаторов), симптоматическая терапия.